ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคุ้มคลั่ง

- ผู้ป่วยจิตเวชเดิม (schizophrenia) ที่มีอาการก้าวร้าว รุนแรง ทำร้ายตนเอง/ผู้อื่น
- ผู้ป่วย alcoholic psychosis / alcohol withdrawal psychosis



R/O organic cause เช่น electrolyte imbalance, ติดเชื้อ , เลือดออกในสมอง



ไม่ใช่ ใช่ รักษาตามสาเหตุ

Haloperidol 5 mg IM (ผู้สูงอายุ > 60 ปีลดขนาดยา ให้ haloperidol 2.5 mg im)

ถ้าไม่สงบให้ซ้ำได้ทุก 30 นาที ไม่เกิน 3 dose

ถ้าไม่สงบให้ diazepam 10 mg iv ให้ซ้ำได้ทุก 30 นาที ไม่เกิน 2 dose



สงบ admit ไม่สงบ ส่งต่อจิตเวชเลยประสานสถานีตำรวจนำส่ง

ที่ ward คุยกับญาติเรื่องการผูกมัด

จัด zoneที่เงียบสงบ ห่างจากผู้ป่วยอื่น

หากเป็นรายใหม่ให้ยาระงับอาการเริ่ม haloperidol(2) 1*2 + benhexol (2) 1*1

จิตเวชรายเก่าให้ยาขนาดเดิมก่อน ปรับตามดุลพินิจแพทย์

รายงานแพทย์เมื่อ – ให้ยาฉีด 1 ครั้งใน ward แล้วอาการไม่สงบ

- ผลข้างเคียงจากการให้ยาเช่น ตัวแข็ง ลิ้นแข็ง ผื่นขึ้น ไข้สูง

(*** อ้างอิงจาก แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559)